

Guía para Cultivar Vegetales en la Florida¹

Sydney Park Brown, Danielle Treadwell, J. M. Stephens, y Susan Webb; traducido por Francisco Rivera²

El cultivo de vegetales le ofrece aire fresco, exposición al sol, ejercicio, diversión, terapia emocional, alimentos frescos nutritivos, ahorros económicos y muchos otros beneficios (Figura 1). Los vegetales pueden crecer durante todo el año en el estado de Florida si se les presta atención a las fechas de siembra correspondientes (Tabla 1).



Figura 1.

Crédito: kazoka30/iStock/Thinkstock.com

Aunque esta guía provea recomendaciones principalmente para huertos tradicionales en el hogar, la información puede resultar útil para varios escenarios como es el desarrollo de huertos comunitarios, los huertos de mercados agrícolas y proyectos de jardinería no-convencionales, como huertos en recipientes o en bancos elevados (consulte la publicación

de EDIS ENH1211, *Gardening in Raised Beds* (<https://edis.ifas.ufl.edu/ep472>).

Pasos para Cultivar Vegetales Localización

Para mayor comodidad, construya el huerto cerca del hogar en un lugar con buen drenaje cerca de una fuente de agua y en un área que reciba al menos seis horas de luz solar directa todos los días. Con el cuidado adecuado, también, puede incluir los vegetales en la huerta entre las plantas ornamentales. También, son adecuados los laterales de algunos lotes residenciales, donde haya luz directa por el tiempo señalado anteriormente. Cuando sea posible, rote los cultivos del huerto de un lugar a otro para controlar las enfermedades del suelo y otras plagas.

Planificación

Antes de plantar, haga la planificación del huerto donde incluya el nombre, la ubicación y las fechas de plantación de los vegetales que quiere cosechar. Use la guía de plantación (Tabla 1) para planificar. Antes de comenzar su haga una lista de los materiales y tenga las semillas disponibles para cultivar, si tiene pensado cosechar sus propios trasplantes. En la guía de plantación hay un listado de las plántulas de vegetales de acuerdo a su facilidad para ser trasplantadas. Los vegetales que son difíciles de trasplantar deben

- Este documento es SP103-SPA, uno de una serie del Department of Horticultural Sciences, UF/IFAS Extension. Publicación original diciembre 1999. Revisado: mayo 2018 y noviembre de 2024. Traducido: septiembre 2020. Visite el sitio web de EDIS <https://edis.ifas.ufl.edu>.
- Sydney Park Brown, profesora asociada emérita, Department of Environmental Horticulture, y profesora adjunta, Center for Landscape Conservation and Ecology; Danielle Treadwell, profesora asociada, Department of Horticultural Sciences, y especialista en agricultura orgánica; J. M. Stephens, profesor emérito, Department of Horticultural Sciences; y Susan Webb, profesora asociada emérita, Department of Entomology and Nematology; UF/IFAS Extension, Gainesville, FL 32611.

sembrarse en recipientes primero o directamente en el huerto.

Preparación del terreno

Los jardineros a menudo plantan sobre cualquier tipo de suelo que esté disponible, pero por lo general resulta útil mejorar la composición del terreno agregando materia orgánica (vea más abajo). Cave o labre la parcela durante al menos tres semanas antes de plantar. En el momento de plantar, vuelva a trabajar el suelo hasta lograr una superficie uniforme y firme.

Materia orgánica

La mayoría de los suelos de Florida tienen poca materia orgánica y, por lo tanto, se mejoran al añadir compost de estiércol de animales, hojas en descomposición, compost de hongos, mezclas de tierra comerciales (mercadeados como potting mix) o cultivos de cobertura. Las materias orgánicas de compost pueden aplicarse al momento de la siembra; la materia orgánica no compostada (como gramas cortadas frescas) deben mezclarse con la tierra por lo menos un mes antes de sembrar. Debido a los niveles bajos e inconsistentes de los nutrientes en la compost, puede resultar útil la aplicación de fertilizantes inorgánicos u orgánicos (consulte “Fertilización” más abajo). Mezcle por completo los materiales orgánicos no compostados en el suelo mucho antes de la siembra, preferiblemente al menos un mes antes de sembrar. Si utiliza fertilizante basado en compost o estiércol de animales, asegúrese de esparcir entre 25 y 100 libras cada 100 pies cuadrados, y déjelo actuar en el suelo de 90 a 120 días antes de cosechar los vegetales. Consulte la publicación HS1215 de EDIS, *Organic Vegetable Gardening in Florida* (<https://edis.ifas.ufl.edu/hs1215>).

Composta

Cree su propio “oro negro” convirtiendo los desechos del patio en compost (Figura 2). La compost es fácil de hacer y produce un acondicionador de suelos o fertilizante orgánico similar al abono que beneficia en gran medida los suelos nativos poco fértiles de Florida. Consulte la publicación ENH 1065 de EDIS, *Compost Tips for the Home Gardener* (<https://edis.ifas.ufl.edu/ep323>).

Construya o compre una compostera. Usted puede construir una unidad con paletas de madera reciclados, bloques de concreto, alambres resistentes, etc. El tamaño mínimo debe ser 3'Largo × 3'Ancho × 3'Alto.



Figura 2.

Crédito: UF/IFAS

Coloque una capa encima de otra de 12 pulgadas de grosor de desechos de plantas, como hojas, pasto cortado, ramas trituradas y virutas. También pueden usarse restos de comida.

Puede agregar estiércol de animales (no de mascotas), compost finalizado, harina de sangre o fertilizante a cada capa si así lo quiere.

Humedezca cada capa y mantenga húmeda la pila.

Voltee (o mezcle) la pila con frecuencia para que ingrese oxígeno y ayude en el proceso de descomposición.

Según como sea manejada la compost, debe estar lista para su uso entre dos y doce meses, cuando se hayan descompuesto las partes de las plantas.

Cubra la pila para evitar que la lluvia lixivie los nutrientes.

Cultivos de cobertura (abono verde)

Los cultivos de cobertura se pueden plantar fuera de estación para evitar la erosión, el crecimiento de malezas o la proliferación de nematodos. Se recomiendan los siguientes cultivos de cobertura para los huertos de Florida:

- Verano: caupí, grano de terciopelo, soya y girasol
- Invierno: centeno de cereal (FL 401), trébol encarnado y arveja austriaca de invierno

Cuando el cultivo de cobertura se pone en el suelo, la materia orgánica en descomposición (abono verde) suministra materia orgánica y nutrientes. Algunos cultivos

de cobertura también pueden suprimir la población de nematodos dañinos.

Para obtener más información, consulte las publicaciones ENY012 de EDIS, *Nematode Management in the Vegetable Garden* (<https://edis.ifas.ufl.edu/ng005>) y ENY059, *Soil Organic Matter, Green Manures, and Cover Crops for Nematode Management* (<https://edis.ifas.ufl.edu/vh037>).

Ajuste del pH del suelo

El pH del suelo es importante porque determina la disponibilidad de nutrientes para las plantas. El mejor rango de pH para los huertos de vegetales en suelos arenosos es un pH entre 5.8 y 6.3. Si el pH del suelo es entre 5.5 y 7.0, no es necesario hacer ningún ajuste al pH.

Si el pH del suelo es inferior a 5.5, aplique cal al valor recomendado por un laboratorio de diagnóstico de suelos confiable, como el laboratorio de prueba de suelos de UF/IFAS Extensión (<https://soilslab.ifas.ufl.edu/>). Poner entre dos y tres libras de cal dolomítica fina cada 100 pies cuadrados, por lo general, aumentará el pH un punto.

Precaución: la aplicación de cal cuando no es necesario puede provocar problemas nutricionales en las plantas. Lo mejor es aplicar la cal entre dos y tres meses antes de plantar el huerto. Sin embargo, se puede aplicar la cal una o dos semanas antes de la siembra. Asegúrese de que la cal esté completamente mezclada en el suelo a una profundidad de 6 de 8 pulgadas y, luego, moje la tierra para promover la reacción química.

Si el pH de la tierra es generalmente superior a 7.0 (alcalino), y hay cali, roca calcárea o conchas presentes, no hay ninguna forma práctica de bajar el pH del suelo de forma permanente. Agregar materia orgánica ácida ayudará, pero solo parcialmente. Use un fertilizante que contenga micronutrientes. Si un pH alto es el resultado de la aplicación previa de cal en exceso, poner azufre granular (1 lb/100 pies cuadrados) disminuirá el pH del suelo.

Fertilización

A menos que se apliquen grandes cantidades de materia orgánica, generalmente se necesita un fertilizante sintético comercial para los huertos en Florida. A los jardineros les resulta cómodo usar los grados de fertilizantes generalmente disponibles, como 10-10-10. Sin embargo, algunos suelos de Florida contienen cantidades adecuadas de fósforo (el valor intermedio). Si este es el caso de su suelo, no se debe agregar más cantidad de este elemento debido a que el fósforo puede contaminar las aguas superficiales, como los lagos y ríos. Hacer una prueba del

suelo permitirá saber la cantidad de fósforo y de otros nutrientes que deben aplicarse. Consulte la publicación de EDIS Cir. 1248, *UF/IFAS Extension Soil Testing Laboratory (ESTL) Analytical Procedures and Training Manual* (<https://ufdc.ufl.edu/IR00003469/00001>).

Utilice la cantidad de fertilizante adecuada basada en los resultados de la prueba del suelo. Coloque al voleo fertilizante sobre toda la era antes de la siembra. Durante la temporada de cultivo, se pueden aplicar 2 o 3 capas ligeras de fertilizante, según sea necesario. Aplique el fertilizante justo más allá de las hojas externas. Los vegetales de hoja como la lechuga, col rizada y berza se benefician de la aplicación lateral de fertilizante con nitrógeno, como el nitrato de amonio. Los cultivos tuberosos y de raíces, como las zanahorias y las patatas (o papas), responden al fertilizante potasio, como el muriato potásico.

Obtenga más información sobre fertilizantes orgánicos y manejo de nutrientes en la publicación de EDIS HS1215, *Organic Vegetable Gardening in Florida* (<https://edis.ifas.ufl.edu/hs1215>).

Irrigación y drenaje

Los vegetales no toleran el agua estancada proveniente de lluvias o la irrigación en exceso. Al mismo tiempo, los vegetales necesitan la humedad del suelo para crecer y producir. La frecuencia de irrigación depende de la edad del cultivo y del tipo de suelo. Las plantas más jóvenes necesitan una irrigación frecuente pero ligera; los cultivos maduros necesitan más agua pero con menos frecuencia. Los suelos arenosos exigen una irrigación más frecuente que los de alto contenido de arcilla, o suelos cenagosos, o los suelos previamente enmendados. Conserve el agua mediante el uso de fertilizantes, materia orgánica y técnicas como el riego por goteo. Presione ligeramente la base de las plantas para conservar el agua hasta que el suelo la absorba.

Extensión de la temporada de los cultivos

Los jardineros pueden extender la temporada de siembra con estructuras que reducen el estrés de las plantas y los daños provocados por temperaturas frías y cálidas. Los productores comerciales usan casas de sombra, túneles altos y cubiertas en fila; los jardineros pueden adoptar modificaciones de estos enfoques (Figura 3). Para obtener más información, consulte las siguientes publicaciones de EDIS *Veggies and Herbs Made in the Shade* (<https://edis.ifas.ufl.edu/hs1228>) y *Row Covers for Growth Enhancement* (<https://edis.ifas.ufl.edu/cv106>). Quite las cubiertas cuando las plantas que necesitan abejas para la polinización comiencen a florecer (vea los vegetales que figuran en la

Tabla 1 que son miembros de la familia de las calabazas o cucurbitáceas).



Figura 3.
Crédito: UF/IFAS

Manejo de Plagas

Algunas de las plagas en los huertos son las malezas, los insectos, los ácaros, las enfermedades, los nematodos, ardillas e incluso los animales como los mapaches y las aves que podrían consumir el cultivo de vegetales (consulte <https://edis.ifas.ufl.edu/vh036>).

Los jardineros tienen muchas opciones para reducir los problemas de plagas (<https://edis.ifas.ufl.edu/in197>). Los plaguicidas utilizados de manera indebida pueden ser perjudiciales para las personas, las mascotas, los insectos beneficiosos y el entorno natural. Su uso debe ser implementado tomando en cuenta otros métodos disponibles para el manejo integrado de plagas.

Enfoques sin plaguicidas

- **Siga las fechas de siembra recomendadas** para cada vegetal ubicado en la Tabla 1. Sin embargo, tenga en consideración que los vegetales plantados a fines del verano o a inicios del otoño (agosto o septiembre) serán más susceptibles a insectos y enfermedades que surgen en climas cálidos. También, los vegetales susceptibles a heladas plantados a fines del invierno o a principios de la primavera pueden sufrir daños por temperaturas bajo el punto de congelación o pueden sufrir daños severos si no se protegen con cubiertas (consulte arriba “Extensión de la temporada de los cultivos” para obtener más información sobre las cubiertas).
- **Rote** los cultivos para no plantar los mismos vegetales (o miembros de la misma familia de vegetales) en las mismas áreas evitando enfermedades. La familia de plantas de cada vegetal figura en la Tabla 1.

- **Labre o voltee manualmente** bien la tierra antes de plantar para evitar los insectos del suelo, especialmente cuando el huerto es un área de césped convertida. Se debe voltear la tierra del huerto y no debe contener malezas, césped ni materiales de madera al menos 30 días antes de la siembra.

- **Controle las malezas** del huerto debido a que estas pueden ser una fuente de plagas y enfermedades. La maleza se controla mejor con la aplicación de una cubierta de plástico o vegetal y retirando manualmente o con azadón las hierbas indeseables. Las cubiertas vegetales recomendadas son la paja, las hojas caídas y subproductos o remanentes de cosechas previas de vegetales (composta no terminada). No se debe usar viruta ni aserrín no descompuesto. Se puede reducir la maleza en el exterior del huerto y entre las filas poniendo varias capas de periódico y, luego, cubriéndolo con hojas.

- **Elija variedades adaptadas** que sean resistentes o tolerantes a los nematodos, a las enfermedades habituales y acondiciones ambientales típicas de su área.
- **Compre trasplantes saludables** que no tengan insectos ni síntomas de enfermedades (como manchas de las hojas o plagas). Evite trasplantes que ya están floreciendo. Considere sembrar sus propios trasplantes de semillas (Figura 4).



Figura 4.
Crédito: WendellandCarolyn/iStock/Thinkstock.com

- **Proteja las plantas contra gusanos cortadores** poniendo un **protector** alrededor de la planta. Puede hacer un protector con vasos de plástico sin fondo o con cajas de cartón enceradas. El protector debe extenderse algunas pulgadas por encima y al menos una pulgada por debajo de la superficie del suelo.
- **Permita que las plantas crezcan vigorosa y saludablemente** suministrando la cantidad de agua y fertilizante adecuada. Una planta saludable a menudo

puede sobrevivir a los ataques de insectos. Demasiado nitrógeno, sin embargo, puede hacer que las plantas estén más expuestas a pulgones y moscas blancas.

- **Inspección y Monitoreo** es recomendable en el huerto dos veces por semana en busca de problemas de plagas. Esto implica inspeccionar las plantas desde los brotes hasta la tierra, incluyendo las superficies de hojas superiores e inferiores. Anote los problemas de plagas y el rendimiento de las diferentes variedades. Incluya fotografías de los insectos, las enfermedades y los insectos beneficiosos que encuentren en su huerto.
- **Identifique los agentes beneficiosos** (mantis religiosas, arañas, insectos de ojos grandes, insectos asesinos, mariquitas y todas las avispas). Algunos de estos artrópodos se pueden comprar, pero recuerde que ya existen naturalmente en Florida muchos insectos beneficiosos, y se irán si no tienen plagas para comer.
- **Siembre flores** en el huerto de vegetales. Proporcionan néctar y polen que atraen a los insectos beneficiosos.
- **Quite los insectos grandes** manualmente y destrúyalos. Colóquelos en un recipiente con agua y jabón donde se hundan y ahoguen.
- **Observe síntomas tempranos de las enfermedades.** Quite las hojas o plantas enfermas para evitar que se dispersen.
- **No entre en pánico y comience a rociar** ante el primer indicio de daños por insectos. La mayoría de las plantas que producen frutas, vainas o mazorcas pueden resistir de un 10 % a un 20 % la pérdida de hojas sin perder la potencial producción.
- **Recolete la cosecha** de inmediato cuando este madura. Dejar las frutas sobremadurar en las plantas a menudo provoca más problemas de insectos.
- **Quite las plantas no productivas** y haga compost o deséchelas.
- **Use la solarización del suelo** para reducir los nematodos, que son gusanos microscópicos que atacan las raíces de los vegetales y reducen el crecimiento y la producción. Esta técnica consiste en usar la energía del sol para calentar el suelo y matar las plagas. Para solarizar el suelo, primero quite la vegetación, luego rompa y humedezca el suelo para activar los nematodos. Cubra el suelo con una película de plástico transparente resistente a rayos ultravioletas. Coloque más tierra en los bordes para sujetar el plástico en su lugar. Se debe hacer la solarización durante las seis semanas de verano más cálidas. Se deben mantener altas temperaturas (superiores a 130°F) para obtener mejores resultados. Consulte las

publicaciones de EDIS ENY012, *Nematode Management in the Vegetable Garden* (<https://edis.ifas.ufl.edu/ng005>).

- **Agregue materia orgánica** a la tierra para reducir las poblaciones de nematodos. La materia orgánica mejora la capacidad del suelo de retener el agua y los nutrientes y, en consecuencia, mejora el vigor de las plantas y su resistencia a las plagas.
- Consulte también la publicación HS1215 de EDIS, *Organic Vegetable Gardening in Florida* (<https://edis.ifas.ufl.edu/hs1215>).

Uso de plaguicidas de manera inteligente

Si opta por usar plaguicidas, consulte la Tabla 3 y siga las instrucciones de la etiqueta del pesticida cuidadosamente.

- **Use plaguicidas solamente cuando hay un problema grave de plagas.** En la oficina local de UF/IFAS Extension pueden proporcionarle información sobre la identificación de insectos. Los jardineros que se dedican a lo orgánico pueden usar algunos productos (microorganismos como el *Bacillus thuringiensis*, por ejemplo y otros <https://edis.ifas.ufl.edu/in197>).
- **Proteja a las abejas y a otros polinizadores.** Aplique insecticidas tarde durante el día cuando están menos activos. El malatión, el carbaril y las piretrinas son especialmente dañinos para las abejas (Figura 5).



Figura 5.
Crédito: UF/IFAS

- **Rocíe las plantas por completo**, y cubra las superficies de las hojas superiores e inferiores.
- **No aplique pesticidas en días con viento.**
- **Evite las quemaduras por rociado**; asegúrese de que las plantas no estén bajo estrés por humedad. Riéguelas, de ser necesario, y deje que las hojas se sequen antes del rociado. Evite usar jabón y aceites cuando el clima es muy cálido.
- **Controle las babosas** con productos que contengan fosfato de hierro. Los productos con metaldehído como ingrediente activo son extremadamente tóxicos para los animales, como los perros y la vida salvaje que pueden atraer.
- **Evite las enfermedades por hongos**. Compre semillas tratadas con fungicidas. Muchas enfermedades se pueden controlar rociando fungicidas si las medidas de control comienzan de manera temprana, idealmente antes de que aparezcan los síntomas. Busque en la etiqueta los nombres de estas sustancias químicas en “ingredientes activos”: clorotalonil, maneb o fungicida mancozeb. El añublo (moho polvoriento) se puede controlar con triadimenol, miclobutanol, azufre o aceites hortícolas. Las royas se pueden controlar con azufre, propiconazol o tebuconazol. Los productos en aerosol generalmente son más eficaces que los que vienen en polvo.
- **Lea la etiqueta.**
 - No todos los pesticidas comerciales pueden usarse en todos los vegetales... Asegúrese de que aparezca el vegetal y la plaga en la etiqueta antes de comprar el producto
 - Siga las instrucciones de la etiqueta para seguir las medidas seguridad y proporciones de mezclas y métodos para la aplicación necesarias para su cultivo.
 - Preste especial atención a los “períodos de espera”; es decir, el tiempo que debe pasar entre la aplicación del plaguicida y la cosecha. Por ejemplo, no se debe cosechar brócoli al que se le ha rociado carbaril (Sevin) hasta pasadas dos semanas después de la aplicación.
 - Siga todas las precauciones de seguridad que figuran en la etiqueta y asegúrese de que las personas y las mascotas se mantengan alejadas del área hasta que el producto rociado se seque.

Los agentes de UF/IFAS Extension se encuentran en cada condado de Florida para apoyarlo. Puede obtener la información de contacto en Find Your Local Office (<https://sfyl.ifas.ufl.edu/find-your-local-office/>).

Reconocimientos

Los miembros del cuerpo docente retirados o reubicados que contribuyeron con la primera y la segunda revisión de esta publicación son R. A. Dunn, profesor retirado, UF/IFAS Department of Entomology and Nematology; G. Kidder, profesor retirado, UF/IFAS Department of Soil, Water, and Ecosystem Sciences; D. Short, profesor retirado, UF/IFAS Department of Entomology and Nematology; G. W. Simone, profesor retirado, UF/IFAS Department of Plant Pathology; y Amanda Gevens, exasistente de profesor, UF/IFAS Department of Plant Pathology.

Tabla 1. Guía de plantación de vegetales de Florida.

Cultivo	Fechas de plantación en Florida (exterior) ¹			Producción cada 10 pies (libras)	Plantas cada 10 pies ²	Días de cosecha ³	Espaciado (pulgadas)	Capacidad de trasplante ⁵	Familia de plantas ⁶
	Norte	Centro	Sur						
Acelga suiza	Sep.-May.	Sep.-May.	Sep.-Mar.	8-12	10-20	45-60	6-12	18	1½-2 (Remolacha) Chenopodiaceae
Apio	Ago.-Feb.	Sep.-Mar.	Oct.-Mar.	15	10-20	75-90	6-12	18	II (Zanahoria) Apiaceae
Brócoli	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Oct.-Ene.	5	8-12	75-90 (50-70)	10-15	24	1½-2 (Repollo) Brassicaceae
Berenjena	Feb.-Mar. Ago.	Ene.-Feb. Ago.-Sep.	Ago.-Feb.	20	3-7	90-115 (70-90)	18-40	36	1½-¾ (Tomate) Solanaceae
Berza	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	15	5-10	70-90 (50-70)	12-24	24	1¼-½ (Repollo) Brassicaceae
Calabacín, invierno	Feb.-Abr. Ago.-Sep.	Ene.-Abr. Ago.-Sep.	Ago.-Mar.	30	2-4	85-120	36-60	60	1½-2 (Calabacín) Cucurbitáceas
Calabacín, verano	Feb.-Abr. Ago.-Sep.	Ene.-Abr. Ago.-Sep.	Ago.-Mar.	15	5-10	40-50	12-24	36	1-1½ (Calabacín) Cucurbitáceas
Calabaza	Principios de julio	Mediados de julio	Principios de agosto	30	2-4	80-100 (70-90)	36-60	60	1½-2 (Calacán) Cucurbitáceas
Cebollas de bulbo	Med. sep.-Med. nov.	Oct.	Oct.	10	30	100-130	4-6	14	1¼-½ (Lirios) Liliáceas
Cebollas (verdes y bulbos)	Ago.-Mar.	Ago.-Mar.	Sep.-Mar.	10	30	50-75 (verdes) 75-100 (bulbos)	2 (verdes) 6-8 (bulbos)	14	1¼-½ (Lirios) Liliáceas
Coliflor	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	8	7-10	75-90 (50-70)	12-18	24	1¼-½ (Repollo) Brassicaceae
Col rábano	Sep.-Mar.	Oct.-Mar.	Oct.-Feb.	10	24-40	70-80 (50-55)	3-5	24	½ (Repollo) Brassicaceae
Col rizada	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	7.5	9-10	50-70	8-12	18-	1½-½ (Repollo) Brasíceas
Endibia/escarola	Ene.-Feb. Ago.-Oct.	Ago.-Feb.	Sep.-Mar.	7.5	8-9	60-80	14-16	18	¼ (Aster) Asteraceae
Espinaca	Sep.-Mar.	Sep.-Mar.	Oct.-Feb.	4	20-60	45-60	2-6	12	½ (Remolacha) Chenopodiaceae
Frutilla	15 de sep.-15 de oct.	25 de sep.-25 de oct.	Oct.	9-12	8-10	(30-60)	12-16	12	— (Rosa) Rosaceae
Guisante, chícharo, arvejas, de nieve o inglesas	Ene.-Mar.	Nov.-Feb.	Nov.-Feb.	4	20-60	60-80	2-6	12	1-1½ (Habichuelas/frijol) Fabaceae
Guisante, chícharo, arvejas, del sur	Mar.-Jul.	Feb.-Ago.	Sep.-Abr.	8	20-60	75-90	2-6	12	1-1½ (Habichuelas/frijol) Fabaceae
Habichuelas, frijol lima	Mar.-Abr. Ago.	Feb.-Mar. Ago.-Sep.	Sep.-Abr.	5	20-40	60-80	3-6	18	1-1½ (Habichuelas/frijol) Fabaceae

Cultivo	Fechas de plantación en Florida (exterior) ¹			Producción cada 10 pies (libras) ²	Plantas cada 10 pies ²	Días de cosecha ³	Espaciado (pulgadas)	Profundidad de la semilla (pulgadas)	Capacidad de trasplante ⁵	Familia de plantas ⁶
	Norte	Centro	Sur			Plantas	Filas ⁴			
Habichuelas, frijol tipo arbusto	Mar.-Abr. Ago.-Sep.	Feb.-Abr. Ago.-Sep.	Sep.-Abr.	4.5	30-60	45-60	2-4	18	1-1½	III (Habichuelas/frijol) Fabaceae
Habichuelas, frijol tipo enredadera	Mar.-Abr. Ago.-Sep.	Feb.-Abr. Ago.-Sep.	Sep.-Abr.	8	24-40	50-70	3-5	36	1-1½	III (Habichuelas/frijol) Fabaceae
Lechuga	Ene.-Feb. Sep.-Oct.	Sep.-Feb.	Sep.-Feb.	7.5	10-15	60-80	8-12	18	¼	I (Aster) Asteráceas
Maíz dulce	Feb.-Abr.	Ene.-Abr.	Oct.-Mar.	12	15-20	65-90	6-8	28	1-1½	III (Césped) Poaceae
Melón cantalupo	Feb.-Abr.	Ene.-Mar.	Dic.-Mar.	15	4-6	85-110 (70-90)	20-36	60	½-1	III (Calabacín) Cucurbitaceae
Mostaza	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	10	12-24	40-50	5-10	12	¼-½	II (Repojo) Brasicáceas
Nabos	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	15	20-60	40-60	2-6	12	¼-½	II (Repojo) Brasicáceas
Ocra/quimbombo/gumbo	Mar.-Jun.	Feb.-Ago.	Ene.-Mar. Ago.-Oct.	7	12-30	60-70	4-10	36	½-1	III (Hibisco) Malváceas
Patata, irlandesa/papa	Ene.-Feb.	Nov.-Feb.	Oct.-Ene.	15	12-24	85-110	5-10	36-42	3-4 (semillas)	II (Tomate) Solanaceae
Patata, papas dulces/camote	Mar.-Jun.	Feb.-Jun.	Dic.-Sep.	30	10-12	85-130	10-12	36	—	I (Bejuco de gloria, Aguinaldo) Convolvulaceae
Pepinos	Feb.-Abr. Julio-Ago.	Ene.-Mar. Sep.	Sep.-Feb.	10	10-20	40-65	6-12	48	½-¾	III (Calabacín) Cucurbitaceae
Pimientos	Feb.-Mar. Jul.-Ago.	Ene.-Mar. Ago.-Sep.	Ago.-Feb.	5	8-13	90-100 (65-75)	9-15	15	¼-½	I (Tomate) Solanaceae
Rabanito	Sep.-Mar.	Sep.-Mar.	Oct.-Mar.	4	120	20-30	1	6	¼	III (Repojo) Brasicáceas
Remolacha	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Oct.-Ene.	7.5	30-60	50-70	2-4	12	½-1	I (Remolacha) Chenopodiaceae
Repojo	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Sep.-Ene.	12	8-13	85-110 (70-90)	9-16	24	¼-½	I (Repojo) Brassicaceae
Repojo chino	Ago.-Feb.	Sep.-Abr.	Sep.-Abr.	10	7-9	70-90 (60-70)	14-18	14	¼-½	I (Repojo) Brassicaceae
Repollos de Bruselas	Ago.-Feb.	Sep.-Feb.	Oct.-Ene.	10	5-7	90-120 (70-90)	18-24	24	¼-½	I (Repojo) Brassicaceae
Rúcula	Sep.-Mar.	Sep.-Mar.	Oct.-Mar.	2.5	30-40	35-60	3-4	10	¼	I (Repojo) Brassicaceae
Sandía	Feb.-Abr.	Ene.-Mar.	Dic.-Mar.	40	3-5	80-100 (60-90)	24-48	60	1½-2	III (Calabacín) Cucurbitaceae
Tomates (permitidos)	Feb.-Abr. Julio-Ago.	Ene.-Feb. Ago.-Sep.	Ago.-Feb.	2	4-7	90-110 (70-90)	18-32	48	¼-½	I (Tomate) Solanaceae

Cultivo	Fechas de plantación en Florida (exterior) ¹			Producción cada 10 pies (libras)	Plantas cada 10 pies ²	Días de cosecha ³	Espaciado (pulgadas)	Profundidad de la semilla (pulgadas)	Capacidad de trasplante ⁵	Familia de plantas ⁶
	Norte	Centro	Sur							
Zanahorias	Ago.-Mar.	Ago.-Mar.	Sep.-Mar.	10	40-120	70-120	1-3	10	¼	II Apiaceae (Zanahoria)

¹Norte = en todo Florida al norte de la carretera estatal 40; centro = la sección de Florida entre las carreteras estatales 40 y 70; sur = todo Florida debajo de la carretera estatal 70.
² Use trasplantes (si corresponde) o compre la cantidad de semillas necesarias para cosechar estas plantas cada 10 pies en la fila. En la mayoría de los paquetes de semillas figura la cantidad de semillas que contienen.

³ Días desde la siembra hasta la cosecha; los valores entre paréntesis son los días desde los trasplantes hasta la primera cosecha.

⁴ Distancia mínima entre las filas (cuando plantar en filas). Se puede reducir o ignorar el espacio entre las filas mientras las plantas tengan el espaciado correcto.

⁵ Capacidad del trasplante (la capacidad de la planta de trasplantarse correctamente): I = sobrevive fácilmente al trasplante; II = sobrevive al trasplante con cuidados; III = solo las semillas de las plantas o los trasplantes en recipientes con sistemas de raíces desarrollados.

⁶ Rote las familias de plantas = evite plantar sucesivamente vegetales de la misma familia en la misma área del huerto.

Tabla 2. Variedades sugeridas de huertos en Florida.

CULTIVO	VARIEDADES RECOMENDADAS ¹	NOTAS/OBSERVACIONES
Acelga suiza	Bright Lights, Bright Yellow, Fordhook Giant, Lucullus, Red Ruby	Se pueden sembrar las semillas en el otoño y a fines del invierno o a principios de la primavera. Es un excelente vegetal de hoja para climas cálidos. Coseche las hojas extemas cuando tengan de 8 a 10 pulgadas de largo. Muy susceptibles a nematodos de pudrición de las raíces.
Apio	Variedades de Utah	Puede ser difícil de cultivar en el huerto de su casa. Necesita suelos muy húmedos durante la etapa de siembra y plántulas. Tiene un período de madurez de 3 meses. Busque variedades que maduren antes.
Brócoli	Early Green, Early Dividend, Green Sprouting/Calabrese, Waltham, Packman, De Cicco, Brócoli Raab (Rapini)	Coseche los extremos antes de que se abran las flores. Se desarrollan muchos brotes pequeños después de que se corta la cabeza principal. Muy resistente al frío y nutritivo. El brócoli Raab no se relaciona con el brócoli.
Berenjena	Black Beauty, Dusky, Long, Ichiban, Cloud Nine (blanca)	Necesita suelos y climas cálidos. Se cosechan en verano. Pueden necesitar estacas. Fruta amarga provocada por las altas temperaturas o condiciones de sequía.
Berza	Georgia, Georgia Southern, Top Bunch, Vates	Tolerante al frío y al calor. Los vegetales de hojas de temporadas frías son más sabrosos. Los vegetales de hoja estarán listos para usarse 2 meses después de haberse plantado. Coseche las hojas que están más abajo; nunca quite más de ¼ de la planta de una vez. Responden bien a los fertilizantes con nitrógeno.
Calabacín	Verano: Early Prolific Straightneck, Summer Crookneck, Early White Scallop, Chayote Calabacín: Cocozelle, Spineless Beauty, Black Beauty, Chayote, Calabaza Invierno: Spaghetti, Table King, Table Queen Y Table Ace (bellota), Waltham, Early Butternut (nuez blanca)	La calabaza de verano y el calabacín por lo general son tipos arbustivos; mientras que la calabaza de invierno tiene hábitos de tipo enredadera. La calabaza es similar, pero es resistente al calor y a las enfermedades y posee una cáscara dura; es similar a la nuez blanca o a la bellota en sabor. El chayote es una cepa que necesita soporte. Todas las cucurbitáceas tienen flores macho y hembra separadas en la planta, y se necesita la polinización por parte de los insectos para la formación de frutos. Se produce el cruce entre los tipos, pero solo resulta evidente cuando se guardan las semillas. Las enfermedades de las hojas y las frutas son bastante habituales. Los tipos de invierno se almacenan bien.
Calabaza	Big Max, Connecticut Field, Prizewinner, Jack Be Little, Jack O Lantern, Calabaza	Necesita mucho espacio, pero se puede cultivar debajo de vegetales más altos. Se necesitan abejas para la polinización. Las enfermedades del follaje y la pudrición de las frutas son habituales.

CULTIVO	VARIEDADES RECOMENDADAS ¹	NOTAS/OBSERVACIONES
Cebollas	Bulbo: Granex (amarilla) Verde: Evergreen Bunching, White Lisbon Bunching Multiplicadores: Escalofías Puerro: American Flag	Según el tipo, se pueden cultivar las cebollas con semillas, plantones, trasplantes o divisiones. Las cebollas de bulbo deben plantarse durante el otoño y deben ser variedades de días cortos. Las cebollas verdes o de bulbos pueden cultivarse durante el otoño hasta la primavera. Plántelas cerca y coséchelas (pórdeladas) según sea necesario. Inserte los plantones de manera recta así los tallos quedan derechos. Divida y trasplante los tipos multiplicadores cada año.
Coliflor	Snowball Strains, Snow Crown, Brocoverde	Puede ser difícil de cultivar. Las plantas son resistentes al frío, pero las cabezas no. Sujete las hojas alrededor de la cabeza (lo que se denomina blanqueo) cuando tenga a 2-3 pulgadas para evitar la decoración o plante variedades que se aclaren solas.
Col rábano	Early White Vienna, Purple Vienna	Es fácil de cultivar. Existen variedades en rojo y verde. Úselas frescas o cocidas. Las hojas son comestibles. Coseche los tallos cuando tengan 1 ½ a 3 pulgadas de diámetro.
Col rizada	Vates Dwarf Blue Curled, Tuscan (lacinato), Winterbor, Redbor	Buena fuente de vegetales de hoja desde fines del otoño hasta principios de la primavera en el norte y la parte central de Florida. Coseche las hojas externas; pero no más de 1/3 de la planta de una vez. Los tipos ornamentales son comestibles, pero no son muy sabrosos.
Endivia/Escarola	Endibia: Ruffec rizado verde Escarola: Hoja ancha Bátava	Excelente ingrediente en ensaladas o puede cocinarse como cualquier vegetal de hojas. Se puede reducir la amargura mediante el blanqueo 2-3 semanas antes de la cosecha. La escarola (endivia Bátava) es una variedad de hoja ancha.
Espinaca	Melody 3, Bloomsdale Longstanding, Tyee, Space	Crece mejor solo durante los meses más fríos. Madurez rápidamente. Coseche la planta entera o quite las hojas externas. La espinaca de Nueva Zelanda y de Malabar, aunque no son las verdaderas espinacas, crecen bien durante los meses cálidos en Florida. Plante espinaca de Nueva Zelanda o acélga suiza durante el verano.
Frutilla	Chandler, Oso Grande, Sweet Charlie, Selva, Camarosa, Festival	Se cultivan todos los años en Florida y se comienza por las plantas sin enfermedades durante el otoño. Plante únicamente las variedades adaptadas a Florida.
Guisante, chícharo, Arvejas inglesas o de nieve	Wando, Green Arrow, Sugar Snap, Oregon Sugarpod II	Fertilice a la mitad de la cantidad recomendada para otros vegetales. Demasiado nitrógeno limita la producción (al igual que las temperaturas cálidas). Pueden necesitar soporte según el tipo. Se deben consumir pronto después de la cosecha para obtener una mejor calidad.
Guisante, chícharo, arvejas del sur (también conocidas como arvejas de campo, chicharrillos, Crowder, arvejas de crema)	California Blackeye n.º 5, Pinkeye Purple Hull, Texas Cream	Altamente nutritivas. Fertilice a la mitad del ritmo usado para otros vegetales; demasiado nitrógeno limita la producción. Es un buen cultivo de cobertura durante el verano. El curculio del caupí es una plaga habitual. Mantenga el suelo húmedo.
Habichuelas, frijol Lima arbusto	Fordhook 242, Henderson, Jackson Wonder, Dixie Butterpea (moteados), Early Thorogreen	Hay del tipo de enredadera y arbustivo; proporcione apoyo con estacas para las variedades trepadoras. Controle las chinches que dañan las vainas. Fertilice a la mitad del ritmo usado para otros vegetales; demasiado nitrógeno limita la producción. Ligeramente más tolerantes al calor que los frijoles enanos o de tipo enredadera. Plante variedades resistentes a la oxidación.
Ejote	Bush Blue Lake, Contender, Roma II, Provider, Cherokee Wax	El frijol arbustivo madura antes y no es necesario ponerle estacas. Fertilice a la mitad del ritmo usado para otros vegetales; demasiado nitrógeno limita la producción. Las flores se polinizan solas. Plante variedades resistentes al añublo (moho polvoriento).
Cáscara: horticultural, pinto, riñón, habichuelas/frijol negro, Habichuelas/frijol blanco, garbanzo		

CULTIVO	VARIADES RECOMENDADAS ¹	NOTAS/OBSERVACIONES
Habichuelas, frijol tipo entredadera	McCaslan, Kentucky Wonder, Blue Lake	Fertilice a la mitad de la razón usada para otros vegetales; demasiado nitrógeno limita la producción. Coloque un apoyo a las cepas. Pueden sembrarse con maíz para el soporte de las cepas. Plante variedades resistentes al ánculo (mildew, hongos).
Lechuga	Repollada: Great Lakes Mantequosa: Ermosa, Bibb, Tom Thumb, Buttercrunch Hoja suelta: Tipos Simpson, Salad Bowl, Red Sails, New Red Fire, Oak Leaf, Salad Bowl, Royal Oak Romana: Parris Island Cos, Outredgeous	Los tipos de hojas crecen bien en Florida; cultive el tipo repollado solo durante los meses más fríos. Sufren daños con temperaturas cálidas provocan que sean amargas. Siembre las semillas de manera poco profunda, ya que necesitan luz para germinar. Haga una siembra intercalada de la lechuga con vegetales de temporada larga o vegetales más altos.
Maíz dulce	Silver Queen (blanco), How Sweet It Is (blanco), Sweet Ice (blanco), Sweet Riser (amarillo), Early Sunglow (amarillo)	Necesita espacio; siémbrelo en bloques de al menos 3 filas para lograr una buena polinización. Separe las diferentes variedades mediante la polinización cruzada. Plántelo donde no haya sombra a otros vegetales. No resulta beneficioso remover los retosños. Cosecharlo temprano en la mañana permite mantener el contenido de azúcar. Observe si hay presencia del gusano elotero del maíz.
Melón tipo "Cantaloupes" y "Honeydews"	Athena, Ambrosia, Galia (pulpa verde)	Se necesitan abejas para la polinización. Propenso a las enfermedades. Coloque abono para reducir la pudrición de la fruta y la salmonela. Regarla excesivamente o las lluvias fuertes reducen el contenido de azúcar de las frutas maduras. Cóséchelo cuando la fruta se separe sin problemas de la ceña aplicando una ligera presión.
Mostaza	Southern Giant Curled, Florida Broad Leaf, Tendergreen, Giant Red, Green Wave, Mizuna	Vegetal de hoja de buena cocción, de otoño a primavera; coseche las hojas externas. Los tipos de hoja ancha necesitan más espacio. Sufren daños con temperaturas heladas. Las temperaturas cálidas hacen que tengan un sabor amargo.
Nabos	Raíces: Purple Top White Globe Vegetales de hojas: Seven Top, Shogoin	Cultivo en climas fríos, de rápido crecimiento. Cultivo de raíces y partes superiores (vegetales de hoja). Coloque las semillas al voleo en una fila ancha o individual. Pódelas de manera temprana para permitir la expansión de la raíz. Las raíces más pequeñas (2") tienen un sabor más suave.
Ocra/quimbombó/gumbo	Clemson Spineless, Emerald, Annie Oakley II, Cajun Delight	Coloque las semillas en agua durante 6 horas para lograr una mejor germinación. Necesita suelos y temperaturas cálidas. Muy tolerante al calor. Altamente susceptible a nemátodos de pudrición de las raíces. Coseche las vainas unos días después de que los pétalos de las flores se hayan caído o que las vainas se endurezcan y estén fibrosas.
Patata irlandesa/papa	Red Pontiac, Yukon Gold, Gold Rush	Plante 2 onzas de semillas certificadas con al menos un ojo. Cada una producirá de 6 a 8 patatas. No comience con las que "se compran en las tiendas". Necesita temperaturas frías, humedad y grandes cantidades de fertilizante.
Batatas, camote	Centennial, Beauregard, Vardaman, Boniato	Comience con trasplantes sin certificado (estacas). Use los cortes de puntas de las cepas en un segundo cultivo y una temporada prolongada de cosecha. Tipos: pulpa húmeda (ñames) y pulpa seca (por ejemplo, boniato). Los tipos arbustivos permiten conservar espacio en el huerto. Los gorgojos de las batatas son un problema grave; rote el sitio de plantación.
Pepinillos	Slicer: Sweet Success, Poinssett, Ashley, MarketMore 76, Straight Eight, Space Master Pickle: Eureka, Boston Pickling	Hay dos tipos: para rebanar y para conservar en vinagre. Los del segundo tipo pueden usarse frescos. Hay variedades Burpless. Muchos híbridos son gineceas (flores hembras); solo las flores hembra producen fruta). Se necesitan abejas para la polinización.
Pimientos	Dulce: California Wonder, Red Knight, Big Bertha, Sweet Banana, Giant Marconi, Cubanelle Picante: Early Jalapeno, Jalapeno M; Cherry Bomb, Hungarian Hot Wax, Big Chile II, Mariachi, Numex, Ancho, Thai, Anaheim Chile, Long Cayenne, Habanero, Caribbean Red Habanero	Los trasplantes a menudo dan mejores resultados que las semillas. Resulta especialmente beneficioso poner abono. Se produce a menudo en verano. Lo "picante" del pimiento depende de la variedad y se mide en unidades Scoville.

CULTIVO	VARIADES RECOMENDADAS ¹	NOTAS/OBSERVACIONES
Rabanito	Cherry Belle, White Icicle, Sparkler, Champion, Daikon	Se cultivan de manera fácil y rápida; debe podarlos de manera temprana y hacer una siembra intercalada con vegetales de cultivo lento para ahorrar espacio. Plántelos cada dos semanas durante la temporada de cultivo para tener un suministro continuo. Los climas cálidos y la madurez excesiva ocasionan un sabor picante y amargo. Los rabanitos orientales o de invierno (como los Dalkon) también se cultivan bien en Florida.
Remolacha	Tall Top, Early Wonder, Detroit Dark Red, Cylindra, Red Ace, Yellow Detroit	La remolacha necesita mucha humedad en el momento de la siembra o se producirá una germinación deficiente. Las hojas son comestibles. Pódelas antes para que las raíces de la remolacha tengan espacio para crecer. Muy tolerantes al frío. Alto contenido de vitaminas y hierro.
Repollo	Rio Verde, Flat Dutch, Round Dutch, tipos de Wakefield, Copenhagen Market, Savoy, Red Acre	Alto contenido en vitaminas, especialmente vitamina C. Temporada larga de plantación durante el otoño y el invierno. Compre plantas limpias para evitar la enfermedad de pudrición negra de los repollos. Necesita mucha humedad y fertilizante. Tolerante a las heladas. Controle la aparición de orugas.
Repollo chino	Michihili, bok choy, Napa, baby bok choy, pak choi, joi choi	Es fácil de cultivar. Hay dos tipos: cabeza (Pekínensis) u hoja abierta (Chinensis). Bok Choy es del tipo de hoja abierta, mientras que Michihili y Napa forman cabezas más ajustadas.
Repollos de Bruselas	Jade Cross, Long Island Improved	Se necesitan climas fríos (58-60 °F) o los repollos se abrirán y no quedarán sólidos. Se recogen los repollos cuando tienen el tamaño de una nuez y están firmes. Los primeros repollos cerca de la parte inferior de la planta son los que estarán listos primero. Quite las hojas que haya debajo de los repollos maduros y, luego, quite los repollos girándolos para sacarlos del tallo. Recoja los repollos en intervalos de alrededor de 2 semanas y manténgalos refrigerados.
Rúcula	Speedy, Astro	Siembre en intervalos de 2 a 3 semanas desde el otoño hasta la primavera para lograr una cosecha continua. Las hojas verde oscuro picantes pueden cocinarse al vapor, hacerse puré (majadas) o usarse frescas en ensaladas y sándwiches. Coseche las hojas individuales según sea necesario o toda la planta cuando tenga una altura de 8 a 10 pulgadas. Las altas temperaturas provocan que la rúcula florezca y sea más amarga.
Sandía	Grande: Jubilee (también conocida como FL Giant), Crimson Sweet, Charleston Grey 133 Pequeña: Sugar Baby, MickeyLee	Las cepas necesitan mucho espacio. Hay tipos de "ice box" más pequeños. Plante variedades resistentes a las enfermedades. Se necesitan abejias para la polinización. Se debe hacer una siembra intercalada de los tipos "sin semilla" con los tipos habituales para que se forme la fruta. Cosechela cuando el melón debajo comience a ponerse amarillo o cuando el zarcillo de la fruta se seque.
Tomates	Fruta grande: Celebrity, Heat Wave II, Better Boy, Beefmaster, BHN44-Southern Star*, Amelia*, BHN 640*, Fasti-Leem™ Fruta pequeña: Sweet 100, Juliet, Red Grape, Sun Gold, Sugar Snack, Sweet Baby Girl Heirloom: Green Zebra, Cherokee Purple, Eva Purple Ball, Brandywine, Mortgage Lifter, Delicious	La colocación de estacas, soportes y abono resulta beneficiosa. Las flores se polinizan solas. La caída de la floración generalmente se debe a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas o a una fertilización con nitrógeno excesiva. Algunos problemas graves son la podredumbre apical, el marchitamiento, las moscas blancas y los minadores. Los de tipo cereza son resistentes al calor. *Resistentes al TSWV (virus del broteado del tomate).
Zanahorias	Imperator, Nantes, Danvers, Chantenay	Cultive las zanahorias sobre una base elevada para obtener mejores resultados. Siembre las semillas de manera poco profunda. Germinan de manera lenta. Mantenga el suelo constantemente húmedo durante la germinación y los períodos de cultivo. Pode las plántulas según el espacio recomendado cuando tienen una pulgada de alto. Excelente fuente de vitamina A.

¹ Hay otras variedades que pueden producir bien también. Las sugerencias se basan en la disponibilidad, el rendimiento y la resistencia a las pestes.

² La información sobre la espinaca de Nueva Zelanda y de Malabar, la calabaza, el chayote y muchos otros vegetales se puede encontrar en: https://edis.ifas.ufl.edu/topic_minor_vegetables

Tabla 3. Productos actualmente clasificados para el manejo de insectos y ácaros en huertos de vegetales en la casa.

Peste	Neem ^{a,e}	Spinosad ^{a,e}	Bt ^{a,e}	Carbaril ^d	Malathin ^d	Piretroides ^{b,d}	Jabón ^{c,e}	Aceites hortícolas ^{c,e}	Imidacloprid ^d	Acetamiprid ^d
Ácaros	X								X	
Áfidos	X			X			X	X	X	X
Alticinos				X	X			X		X
Barrenador de la cepa de calabaza			X				X			
Chinchas									X	
Curculio del caupí			X			X				X
Escarabajo de la patata			X					X		
Escarabajo del pepino	X			X			X			X
Escarabajo mexicano del frijol				X			X			X
Gusano cogollero	X		X				X			X
Gusano del tomate, oxiuros			X				X			X
Gusano elotero del maíz			X				X			X
Gusano melón, gusano de la salmuera			X				X			
Minadores	X									
Moscas blancas	X			X			X	X		X
Oruga de la col		X		X			X			
Orugas de la palomilla dorso de diamante			X							
Saltamontes				X				X		
Tripidos		X						X		X
Virus de enrollamiento de la hoja del frijol		X		X			X			

La X significa que el producto es de alguna manera eficaz para controlar la plaga que se menciona. Consulte el "ingrediente activo" en las etiquetas de los productos para determinar qué pesticidas contienen los productos. También, observe los vegetales específicos para conocer cuándo se puede usar el producto. Preste especial atención al período de espera indicado en la etiqueta. Este es el tiempo que tiene que transcurrir entre la aplicación del plaguicida y la cosecha.

^a *Bacillus thuringiensis*

^b Incluye bifentrina, cialotrina, ciflutrina, esfenvalerato y permetrina.

^c Pruebe en algunas plantas primero debido al potencial de quemadura de hojas; no lo use en climas calidos.

^d Para proteger a las abejas y a otros polinizadores, no aplique este insecticida cuando la planta esté floreciendo.

^e Productos menos tóxicos